



Information till dig som ska opereras för Mortons syndrom

Ortopedkliniken
Länssjukhuset Halmstad
Ulf Larsson 2008-10-30
035-13 12 55

Din åkomma

Beror på att känselnerven mellan två tår klämts. Då bildas en knuta på nerven som kan ge belastningssmärta.

Operation

”Knutan” avlägsnas genom ett 3-4 cm långt hudsnitt, på under- eller översidan av foten.

Bedövning

Lokalbedövning över det aktuella området med Carbocain, liknande det man får hos tandläkaren.

Smärta

Då bedövningen släpper kan man uppleva smärta, men det brukar vara övergående och några starkare värktabletter utöver Panodil och högläge krävs i allmänhet inte.

Hemfärd

Efter ingreppet får man återvända hem samma dag. Det är olämpligt att man kör bil själv eller cyklar.

Omläggningar

En plåsterlapp sätts över operationsområdet. Utanför detta läggs ett tryckförband som kan avlägsnas nästa dag. Suturtagning hos distriktssköterskan efter 10-14 dagar.

Återbesök

Brukar inte behövas.

Sjukskrivning

Beroende på arbete, men vanligtvis inte.

Rådgivning

Eftersom känselnerven i princip tas bort kan 3:e och 4:e tån bli utan känsel vilket kan kännas lite underligt ett tag innan man har vant sig.

Komplikationer

Såsom vid andra operationer kan såret bli infekterat, men det är ovanligt. Skulle du misstänka något sådant så kontakta Ortopedmottagningen